

トライビームトニング 同意書

- トライビームトニングは、低出力のレーザーをお顔全体に照射する施術で、これによりお顔のメラニン色素を徐々に減らし、照射箇所のトーンアップ、ブライティング効果が期待できます。照射箇所の肝斑や炎症後色素沈着の改善に効果が期待できます。
- レーザー照射後は日常的なスキンケアを行い、保湿を十分におこなってください。また、日焼けしたり、肌への刺激を加えたりしますと、色素沈着を生じる可能性があります。トライビームトニングによる治療期間中は、低刺激の日焼け止めの使用等により紫外線対策を十分に行ったうえで、日焼けは避けて下さい。
※日焼けの状態によっては、レーザー照射を延期する場合がございますので、ご了承下さい。レーザー照射箇所及びその周辺箇所のお肌へのマッサージやピーリング等は避けて下さい。
- 治療効果の有無や大小、一定の効果が出るまでに必要な治療回数、及び、効果の持続期間等には個人差があり、治療完了後に再発することもあります。予めご了承下さい。
- 次回の治療の際には、当クリニックが指示した施術間隔を守っていただくようお願いいたします。
- レーザー照射後に赤み、腫れ、毛嚢炎、水泡などの軽重問わないやけどの症状や、炎症後色素沈着、色素脱失、硬毛化などを起こす場合があります。他院でレーザーを受けられて、上記のような症状が出たことがある方や、そのような経験はなくても敏感肌の傾向がある方は、事前にお申し出下さい。炎症後色素沈着は、場合によってはもとのシミより濃くなる場合があります、3～6ヶ月程度かけて徐々に改善してくる場合もありますが、色素沈着等が残ってしまう場合もあります。扁平母斑など疾患によっては、もとの状態より濃くなることや再発することもあります。
- レーザー照射後、皮膚トラブルが生じた場合は、当クリニックにおいて診察させていただきますので受診をお願いいたします。※この受診に関する費用は、全てご自身でご負担いただく必要があります、例示として、診察には診療代がかかり、薬等が処方される場合には別途薬代もかかりますので、ご了承ください。
- 妊娠中、てんかんを持病にお持ちの方の施術は、お断りしております。
- また既往歴・現病歴、現在内服中のお薬があれば、必ず事前にお申し出下さい。
- 授乳中の方は、トラブルが起きた際に内服薬を使用することができないため、出力を上げられない場合がございます。
- 治療部位に癌、感染症、傷や皮膚腫瘍がある方、金の糸が入っている方、金製剤による治療歴が直近の1年にある方、ペースメーカーや除細動器を入れている方は、治療を控えて頂きます。
- 治療部位に金属やシリコン、インプラントを入れている方、光アレルギーの方、心臓疾患のある方、出血性疾患のある方、糖尿病の方、ケロイド体質の方、単純ヘルペスの活動病変がある方、過度な日焼けをされている方は、治療が受けられない場合があります。
- 残しておきたいホクロがある場合は、施術前に看護師にお申し出下さい。ただ、当該ホクロ及びその周辺箇所のレーザー照射を回避しますので、これらの部分については治療効果が得られないことになります。予めご了承ください。
- レーザーや医療機器は、いずれも精密機器です。万が一、機器にトラブルがあった際には、同日に治療を受けていただけないことがありますので、ご了承ください。

私は上記内容を理解し、自分自身の意思で施術に同意いたします。

本人（18歳未満の場合は、法定代理人欄の両方にご署名が必要です）

記入日：西暦

年

月

日

氏名	フリガナ	押印

法定代理人（親権者・後見人・保護義務者あるいは保証人）

記入日：西暦

年

月

日

氏名	フリガナ	押印

（続柄）

一般社団法人ひより会 ひよりクリニック 心齋橋院
大阪府大阪市中央区心齋橋筋2丁目7-18 プライムスクエア心齋橋 8F
TEL:06-6211-2811

以上の内容について、私が説明して患者様の同意を確認し、且つ診察しました。

担当医